

リアップX5

第1類医薬品

セルフチェック

「リアップX5」を購入される前に、次のフローチャートに従って、この医薬品が使用できることをチェックしてください。

スタート

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある。

はい

使用しないでください。

いいえ

女性である。

はい

「リアップX5」は男性用です。女性の方は「リアップレディ」のチェックシートをご利用ください。

いいえ

20歳未満である。

はい

使用しないでください。

いいえ

頭髮が簡単に抜けてしまったり、
脱毛の部分か円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。

はい

使用しないでください。

いいえ

急激に脱毛している。

はい

(壮年性脱毛症以外の要因による
脱毛症の可能性あります。)

いいえ

以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛ではない。



はい

使用しないか、使用する前に、
医師または薬剤師に相談してください。

いいえ

家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。

はい

(壮年性脱毛症以外の要因による
脱毛症の可能性あります。)

いいえ

あなたは「壮年性脱毛症(男性型脱毛症)」と考えられます。

頭皮にきず、湿疹あるいは炎症(発赤)がある。

はい

きず、湿疹あるいは炎症(発赤)を
治してから再確認してください。

いいえ

65歳以上である。

はい

使用する前に、医師または薬剤師に相談してください。

いいえ

高血圧・低血圧で現在治療を受けている。
狭心症等、心臓に障害がある。

はい

使用を控えられることをお奨めします。
使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

いいえ

甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、
甲状腺機能亢進症)の診断を受けている。

はい

使用する前に、医師または薬剤師に相談してください。
(甲状腺疾患による脱毛の可能性あります。)

いいえ

薬や化粧品でアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、
かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある。
高血圧または低血圧である。
心臓や腎臓に障害がある。むくみがある。

はい

使用する前に、医師または薬剤師に相談してください。
(副作用の発現率が高くなる可能性があります。)

いいえ

上記のいずれにも該当しない方は右に○をしてください。■

使用上の注意や製品パッケージに記載された事項をよくお読みになり、購入してください。

★何かで不明な点がございましたら、薬剤師にご相談ください。

リアップX5 第1類医薬品

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

用法・用量

成人男性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

成分・分量 100mL中

ミノキシジル5.0g
添加物:1,3-ブチレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、リン酸、エタノール

使用上の注意

してはいけないこと

- 1.次の人は使用しないでください。
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)女性。
 - (3)未成年者(20歳未満)。
 - (4)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。
 - (5)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
- 2.次の部位には使用しないでください。
 - (1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
 - (2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。
- 3.本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。

『リアップX5』を購入される方へ

『リアップX5』は、ミノキシジルを有効成分とする男性用の発毛剤です。
『リアップX5』を正しくお使いいただくため、次のことをお守りください。

『リアップX5』を使用する前に・・・

★このチェックシートで男性の壮年性脱毛症のセルフチェックを行ってください。

★次の場合は『リアップX5』を使用しないでください。

- 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 女性(本剤は5%ミノキシジル製剤であり、日本人女性における安全性が確認されていないため、女性の方は1%ミノキシジル製剤である『リアップレディ』をご使用ください)。
- 未成年者(20歳未満)。
- 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人。
- 原因のわからない脱毛症の人。
- 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
- 頭皮にきず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある場合。

★次の方は『リアップX5』の購入前に必ず医師または薬剤師に相談してください。

- 高血圧・低血圧で現在治療中の方。
- 狭心症等、心臓に障害のある方。
- 甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)の方。

★『リアップX5』の購入前に必ず下記の説明文をお読みください。

リアップX5(5%ミノキシジル製剤)は、リアップ(1%ミノキシジル製剤)に比べ、有効成分ミノキシジルの含有濃度が高く、接触皮膚炎や湿疹等の皮膚症状の副作用発現頻度が高い結果を得ていますが、有効性(毛髪数の変化)においては優れる結果を得ています。それぞれの薬剤の特徴を充分理解したうえで、製品のご購入をお願いします。また製品を選択するうえでわからない点がありましたら、必ず薬剤師にご相談ください。

『リアップX5』を使用しているときの注意!

★以下のような場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

- 頭皮に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等の症状があらわれた場合。
- 頭痛が起きた場合。
- 胸の痛みがでたり、心拍が速くなったり、気が遠くなったり、めまいが起きた場合。
- 原因のわからない急激な体重増加がみられた場合。
- 手足がむくんだ場合。
- 脱毛状態の悪化や、頭頂部だけでなく側頭部や後頭部などの頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛などがみられた場合。

★使用に際しては添付の説明書をよく読み、正しくお使いください。



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

お客様119番室

電話 **03-3985-1800** 受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)